

Seminar 9

Integrale de suprafață

Noțiuni teoretice

Integralele de suprafață sînt similare celor curbilini, cu modificarea că acum suportul pe care integrăm este o suprafață bidimensională.

Analogul curbelor parametrizate $\gamma(t)$ din cazul curbilini vom avea *pînze parametrizate* $\Phi(u, v)$.

Integrala de suprafață de speța întâi se calculează în următorul context și cu formula de mai jos. Fie $\Phi : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ o pînză parametrizată, iar $\Sigma = \Phi(D)$ imaginea ei. Fie $F : U \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă pe imaginea pînzei. Integrala de suprafață a lui F pe Σ este, prin definiție:

$$\int_{\Sigma} F(x, y, z) d\sigma = \iint_D F(\Phi(u, v)) \cdot \left\| \frac{\partial \Phi}{\partial u} \times \frac{\partial \Phi}{\partial v} \right\| du dv,$$

unde $\Phi(u, v)$ este o parametrizare a suprafeței, iar:

- $\vec{T}_u = \frac{\partial \Phi}{\partial u}$ este *vectorul tangent* la suprafață în direcția parametrului u ;
- $\vec{T}_v = \frac{\partial \Phi}{\partial v}$ este *vectorul tangent* la suprafață în direcția parametrului v ;
- $\vec{T}_u \times \vec{T}_v = \vec{N}$ este *vectorul normal* la suprafață.

În multe situații, parametrizarea suprafeței Σ este dată într-o formă particulară, numită *parametrizarea carteziană*. În acest caz, avem $z = f(x, y)$, cu $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Pentru această situație, formula de mai sus se simplifică și este:

$$\int_{\Sigma} F(x, y, z) d\sigma = \iint_D F(x, y, f(x, y)) \sqrt{1 + p^2 + q^2} dx dy,$$

unde coeficienții sînt $p = z_x$, $q = z_y$.

Cazuri particulare de interes:

- Pentru $F = 1$, obținem *aria suprafeței* Σ ;
- Dacă $F \geq 0$ este densitatea unei plăci Σ , atunci *masa ei* se calculează prin $M = \int_{\Sigma} F d\sigma$, iar *coordonatele centrului de greutate* sînt $x_i^G = \frac{1}{M} \int_{\Sigma} x_i F d\sigma$;
- Dacă F este interpretat ca un câmp vectorial, atunci integrala de suprafață dă *fluxul câmpului*:

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{F}) = \iint_D F(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot (\vec{T}_u \times \vec{T}_v) du dv.$$

Pentru **integralele de suprafață de speța a doua**, considerăm o *2-formă diferențială*:

$$\omega = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$$

și fie o pînă parametrizată:

$$\Phi : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \Phi(u, v) = (X(u, v), Y(u, v), Z(u, v)).$$

Atunci integrala pe suprafața orientată Σ a formei diferențiale ω este definită prin:

$$\int_{\Sigma} \omega = \iint_D \left((P \circ \Phi) \cdot \frac{D(Y, Z)}{D(u, v)} + (Q \circ \Phi) \cdot \frac{D(Z, X)}{D(u, v)} + (R \circ \Phi) \cdot \frac{D(X, Y)}{D(u, v)} \right) du dv,$$

unde $\frac{D(Y, Z)}{D(u, v)}$ etc. sînt jacobienii funcțiilor X, Y, Z în raport cu variabilele u, v . Mai precis, avem, de exemplu:

$$\frac{D(Y, Z)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} Y_u & Y_v \\ Z_u & Z_v \end{vmatrix}.$$

Putem scrie formula de mai sus într-o variantă simplificată, anume:

$$\int_{\Sigma} \omega = \iint_D \begin{vmatrix} P \circ \Phi & Q \circ \Phi & R \circ \Phi \\ X_u & Y_u & Z_u \\ X_v & Y_v & Z_v \end{vmatrix} du dv.$$

Exerciții

1. În fiecare din exemplele următoare, considerăm:

$$D \ni (u, v) \mapsto \Phi(u, v) = (X(u, v), Y(u, v), Z(u, v)) \in \mathbb{R}^3$$

o pînă parametrizată. Să se calculeze vectorii tangenți la suprafață și versorul normalei la suprafață.

(a) *Sfera*: Fie $R > 0$ și $\Phi : [0, \pi] \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$\Phi(\theta, \varphi) = (R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta);$$

(b) *Paraboloidul*: Fie $a > 0, h > 0$ și $\Phi : [0, h] \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$\Phi(u, v) = (au \cos v, au \sin v, u^2);$$

(c) *Elipsoidul*: Fie $a, b, c > 0$ și $\Phi : [0, \pi] \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$\Phi(\theta, \varphi) = (a \sin \theta \cos \varphi, b \sin \theta \sin \varphi, c \cos \theta);$$

(d) *Conul*: Fie $h > 0, \Phi : [0, 2\pi) \times [0, h] \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$\Phi(u, v) = (v \cos u, v \sin u, v);$$

(e) *Cilindrul*: Fie $a > 0, 0 \leq h_1 \leq h_2, \Phi : [0, 2\pi) \times [h_1, h_2] \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$\Phi(\varphi, z) = (a \cos \varphi, a \sin \varphi, z);$$

(f) *Torul*: Fie $0 < a < b, \Phi : [0, 2\pi) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$\Phi(u, v) = ((a + b \cos u) \cos v, (a + b \cos u) \sin v, b \sin u).$$

(g) *Parametrizarea carteziană*: Fie $D \subseteq \mathbb{R}^2$ și $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, cu $f \in \mathcal{C}^1(D)$:

$$\Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \Phi(x, y) = (x, y, f(x, y)).$$

Indicație: Vectorii tangenți la suprafață sînt $\frac{\partial \Phi}{\partial u}$ și $\frac{\partial \Phi}{\partial v}$, iar versorul normalei este:

$$\frac{1}{\left\| \frac{\partial \Phi}{\partial u} \times \frac{\partial \Phi}{\partial v} \right\|} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial u} \times \frac{\partial \Phi}{\partial v}.$$

2. Fie $\omega = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$ o 2-formă diferențială, iar Σ , imaginea unei pînze parametrizate. Să se calculeze integrala de suprafață $\int_{\Sigma} \omega$ în cazurile:

(a) $\omega = ydy \wedge dz + zdz \wedge dx + xdx \wedge dy$, unde:

$$\Sigma : \begin{cases} X(u, v) = u \cos v \\ Y(u, v) = u \sin v \\ Z(u, v) = cv \end{cases}$$

cu domeniul $(u, v) \in [a, b] \times [0, 2\pi)$;

(b) $\omega = xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy$, unde:

$$\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = R^2;$$

(c) $\omega = yzdy \wedge dz + zxdz \wedge dx + xydx \wedge dy$, unde:

$$\Sigma : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1;$$

(d) $\omega = xdy \wedge dz + ydz \wedge dx$, unde:

$$\Sigma : x^2 + y^2 = z^2, \quad z \in [1, 2];$$

(e) $\omega = (y + z)dy \wedge dz + (x + y)dx \wedge dy$, unde:

$$\Sigma : x^2 + y^2 = a^2, \quad a \in [0, 1]$$

3. Să se calculeze integrala de suprafață de prima speță:

$$\iint_{\Sigma} F(x, y, z) d\sigma$$

în următoarele cazuri:

(a) $F(x, y, z) = |xyz|$, iar $\Sigma : x^2 + y^2 = z^2, z \in [0, 1]$;

(b) $F(x, y, z) = y\sqrt{z}$, iar $\Sigma : x^2 + y^2 = 6z, z \in [0, 2]$;

(c) $F(x, y, z) = z^2$, iar $\Sigma = \{(x, y, z) \mid z = \sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 - 6y \leq 0\}$.

4. Folosind integralele de suprafață, să se calculeze ariile suprafețelor:

(a) sfera de rază R ;

(b) conul $z^2 = x^2 + y^2, z \in [0, h]$;

(c) paraboloidul $z = x^2 + y^2, z \in [0, h]$.

5. Să se calculeze aria suprafeței Σ în următoarele cazuri:

(a) $\Sigma : 2z = 4 - x^2 - y^2, z \in [0, 1]$;

(b) Σ este submulțimea de pe sfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, situată în interiorul conului $x^2 + y^2 = z^2$, în semispațiul $z \geq 0$;

(c) Σ este submulțimea de pe sfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, situată în interiorul cilindrului $x^2 + y^2 - Ry = 0$;

(d) Σ este submulțimea de pe paraboloidul $z = x^2 + y^2$, situată în interiorul cilindrului $x^2 + y^2 = 2y$.

6. Să se calculeze fluxul câmpului vectorial \vec{V} prin suprafața Σ în următoarele cazuri:

(a) $\vec{V} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, iar $\Sigma : z^2 = x^2 + y^2$, cu $z \in [0, 1]$;

(b) $\vec{V} = y\vec{i} + x\vec{j} + z^2\vec{k}$, iar $\Sigma : z = x^2 + y^2$, cu $z \in [0, 1]$;

(c) $\vec{V} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}(y\vec{i} - x\vec{j} + \vec{k})$, iar $\Sigma : z = 4 - x^2 - y^2, z \in [0, 1]$.